

14 Verwendete Literatur

- BERDOWSKI, J. & H. SIEPEL (1988): Vegetative regeneration of *Calluna vulgaris* at different ages and fertilizer levels. – Biological Conservation. Barking **46/2**: 85-93.
- BERNHARDT, A., HAASE, G., MANNSFELD, K., RICHTER, H. & R. SCHMIDT (1986): Naturräume der sächsischen Bezirke. - Sächs. Heimatblätter, H. **4/5**.
- BLAB, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. – Schriftenreihe Landschaftspflege Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg **24**. 479 S.
- BÖHNERT, W., GUTTE, P. & A. SCHMIDT (2001): Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Sachsen. – Materialien Naturschutz Landschaftspflege 2001.
- BREINL, K. & P. KNEIS (2000): Nachweis des Steppengrashüpfers (*Chorthippus vagans* Evermann, 1848) für Sachsen im Naturschutzgebiet „Gohrischheide und Elbniederterasse Zeithain“. - Mitt. Sächs. Ent. **50**: 3-5.
- DETZEL, P. (1995): Zur Nomenklatur der Heuschrecken und Fangschrecken Deutschlands. – Articulata **10**: 3-10.
- DETZEL, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. - Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart.
- EBERT, G. (1994): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 3 Nachtfalter. - 1. Aufl. Stuttgart. Ulmer.
- ECKERT, G. (1992): Beobachtungen zur Bewertung der Einflüsse gezielter Weidenutzung mit Schafen und Ziegen auf die Vegetationsentwicklung der Wacholderheiden. – Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **67**: 137-152.
- EIGNER, J. & A. EIGNER (1990): Pflegemaßnahmen in Trockenbiotopen auf Hügelgräbern in Heiligenhafen, Schleswig-Holstein -erste Ergebnisse-. - Natur u. Landschaft **65** (2): 74-78.
- ENDE, M. v.D. (1993): Heidemanagement in Schleswig-Holstein. NNA-Berichte. Schneverdingen **6/3**: 53-62.
- FBM (1999): Zwischenbericht des Forschungsverbundes Braunkohlentagebaulandschaften Mitteldeutschlands (FBM) „Konzepte für die Erhaltung, Gestaltung und Vernetzung wertvoller Biotope und Sukzessionsflächen in ausgewählten Tagebausystemen“. Band 2, Teilprojekt C.1. Untersuchung der spontanen Sukzession und zum Management naturschutzfachlich wertvoller Sukzessionsstadien.
- FISCHER, P. (2003): Trockenrasen des Biosphärenreservates „Flußlandschaft Elbe“. Vegetation, Ökologie und Naturschutz. – Archiv naturwissenschaftlicher Dissertationen, Band **15**. Martina-Galunder-Verlag, Nümbrecht.
- FISCHER, S.F., POSCHLOD, P. & B. BEINLICH (1995): Die Bedeutung der Wanderschäfarei für den Artenaustausch zwischen isolierten Schaftriften. – Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **83**: 229-256.
- HARDTKE, J & A. IHL (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsen. – Materialien zu Naturschutz Landschaftspflege 2000.
- HERMANS, J.T. & U. KRÜGER (1991): Die nordwestliche Ausbreitungstendenz von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigonidae) im Gebiet zwischen Rhein und Maas. - Articulata **6**(1): 52 – 60.
- HOHENESTER, A. (1960): Grasheiden und Föhrenwälder auf Diluvial- und Dolomitsanden im nördlichen Bayern. – Ber. Bayer. Bot. Ges. **33**: 1-56.
- JEDICKE, E. (1997): Die Roten Listen: gefährdete Pflanzen, Tiere, Pflanzengesellschaften und Biotope in Bund und Ländern, Stuttgart, Ulmer: 1997.
- JEDICKE, E., FREY, W., HUNSDORFER, M. & E. STEINBACH (1996): Praktische Landschaftspflege: Grundlagen und Maßnahmen. – Ulmer, Stuttgart.

- JENTSCH, A. (2001): Bitte Stören! Vegetationsdynamik in Sandlebensräumen. – In: SANDACHSE FRANKEN (Hrsg.): Forschung und Naturschutz in Sandlebensräumen. – Tagungsband 50-53.
- KLEINERT, A. (1996): Wachstum und Qualität von Eichen-Hähersaaten im Forstamt Weißwasser. – Vortrag anlässlich der Herbstexkursion der ANW-Landesgruppe Sachsen am 07.10.95 im sächsischen Forstamt Weißwasser.
- KROLUPPER, N. & A. SCHWABE (1998): Ökologische Untersuchungen im Darmstadt-Dieburger Sandgebiet (Südhessen): Allgemeines und Ergebnisse zum Diasporen-Reservoir und – Niederschlag. – Bot. Naturschutz Hessen **10**: 9-40.
- LFUG (2004): Anleitung zur Dokumentation der Erfassung faunistischer Indikatoren zur LRT-Bewertung in Erhebungsbögen. – Stand 20.04.2004.
- LUDWIG, G., DÜLL, R., PHILIPPI, G., AHRENS, M., CASPARI, S., KOPERSKI, M., LÜTT, S. SCHULZ, F. & G. SCHWAB (1996): Rote Liste der Moose (Anthocerophyta et Bryophyta) Deutschlands. – Schr.-R. Vegetationskunde **28**: 189-306.
- MANNSFELD, K. & H. RICHTER (Hrsg.) (1995): Naturräume in Sachsen. – Forschungen zur deutschen Landeskunde **238**, Trier.
- MÜLLER, F. (1998): Rote Liste Moose. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1998.
- OEKOKART (1995): Landschaftsrahmenplan des Landkreises Torgau-Oschatz für das Gebiet des ehemaligen Landkreises Torgau. – unveröff. Gutachten im Auftrag des Landratsamtes Torgau.
- REGIONALER PLANUNGSVERBAND WESTSACHSEN (2001): Regionalplan Westsachsen. Verbindlicher Plan gemäß Genehmigung vom 15.03.2001.
- RHODE, U. (1994): Schutz- und Pflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schöнау-Galgenbuckel“. – Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **80**: 353-369.
- SAMBRAUS, H. H. (1990): Alte Haustierrassen in Norddeutschland-Merkmale und Zuchtgeschichte. – NNA-Berichte. Schneverdingen **3**(1990): 27-39.
- SCHMIDT, P. A.; HEMPEL, W.; DENNER, M.; DÖRING, N.; GNÜCHTEL, A.; WALTER, B. & D. WENDEL (2003): Digitale Fachdaten zur Potentiellen Natürlichen Vegetation Sachsens. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.) - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden 2003.
- SCHUBERT, R. (2001): Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts. – Mitt. florist. Kartierung Sachsen-Anhalt. Sonderheft 2.
- SCHULZE, M. & F. MEYER (2001): Schutz und Pflege von Zwergstrauchheiden in Sachsen-Anhalt - am Beispiel der „Woltersdorfer Heide“. – Naturschutz Land Sachsen-Anhalt. **38/2**: 3-19.
- SETTELE, J., FELDMANN, R. & R. REINHARD (1999) (Hrsg.): Die Tagfalter Deutschlands. – Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
- SOMMER, W.-H. (1971): Wald- und Ersatzgesellschaften im östlichen Niedersachsen. – Diss. Bot. **12**: 1-101.
- SSYMAN, A. (1994): Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz. Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU. – Natur und Landschaft **69**: 395-406.
- TRAUTNER, J. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1995): Faunistisch-ökologischer Bearbeitungsstand, Gefährdung und Checkliste der Laufkäfer. Eine Übersicht für die deutschen Bundesländer. – Naturschutz und Landschaftsplanung **27** (3): 96 – 105.
- TÜXEN, R. (1937): Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. – Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgem. **3**: 1-170.

- WEIDEMANN, H.J. (1995): Tagfalter: beobachten, bestimmen. - 2., völlig neu bearb. Aufl., Augsburg. Naturbuchverlag.
- WALLASCHEK, M. (1999): Bestandsentwicklung der Heuschrecken (Saltatoria). – In: FRANK, D. & V. NEUMANN (1999): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart. S. 432-537.
- WILMANN, O. & K. MÜLLER (1976): Beweidung mit Schafen und Ziegen als Landschaftspflegemaßnahme im Schwarzwald? – Natur und Landschaft **51**: 271-274.
- WOIKE, M. & P. ZIMMERMANN (1997): Biotop pflegen mit Schafen. – Bonn: AID. (1997)