

## Endbericht

### Kartierung gewässergebundene Brutvögel Imnitzer Lachen


Bearbeiter: Mike Jessat

Insgesamt wurden **17 Arten** nachgewiesen, die nicht alle als Brutvögel in den Imnitzer Lachen vorkommen (alphabetisch geordnet).

Nr.	Art	Wiss. Bezeichnung	Status	VS-RL	RL D	RL SN
1	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	BV			
2	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	BV	II/1, III/2		
3	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				3
4	<b>Eisvogel</b>	<b><i>Alcedo atthis</i></b>	<b>BV</b>	<b>I</b>	<b>V</b>	<b>3</b>
5	Flussuferläufer	<i>Alcedo hypoleucos</i>				
6	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	BV			
7	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>		II/2		
8	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>		II/1	3	1
9	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	BV, Kolonie	II/2		
10	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		II/1, III/2		
11	Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	BV			
12	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>		II/2		
13	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	BV			
14	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		II/1, III/2		
15	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	BV	II/2	V	3
16	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	BV			
17	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Brutverdacht			3


**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*)

- zwei erfolgreiche Bruten: ●
- ein Nestbauanfang, Brutplatz verlassen: ○




### Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

- ein Brutverdacht, Brutplatz verlassen




### Höckerschwan (*Gycnus olor*)

- ein Brutverdacht im Mai, später nicht bestätigt oder angehenden Brutplatz verlassen




### Stockente (*Anas platyrhynchos*)

- Brutnachweise: ●
- Brutverdacht: ○




**Tafelente** (*Aythya ferina*)



### Reiherente (*Aythya fuligula*)

- derzeit Nachweise noch nicht möglich



**Schellente** (*Bucephala clangula*)


Aufenthaltsraum von einem Paar Anfang Mai:






**Knäkente** (*Anas querquedula*)

- ein Nachweis eines Männchens zur Brutzeit: ○




**Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)**

- Brutzeitfeststellungen: ●




### Blässhuhn (*Fulica atra*)

- Neststandorte ●
- Brutverdacht ○




### Flussuferläufer (*Alcedo hypoleucos*)

- Nachweise nur im Mai, Brut unwahrscheinlich




### Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

- 22 Nester sichtbar, bis 25 Bruten möglich




### Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- Bruthöhle im Ostufer der Großen Lehmliche: ●
- registrierte Nahrungsräume: ●
- während der Jungenfütterung häufig genutzte Flugroute: ↗




**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)**




**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)**

- eine Feststellung, kein Brutplatz





**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)**



**Rohrammer** (*Emberiza schoeniclus*)

